

Odstránenie benígneho - nezhubného nádoru prsníka (extirpácia)

Dôvod operácie:

Odstránenie nezhubného nádoru prsníka, ktorý predstavuje určité riziko onkologickej choroby alebo spôsobuje pacientke (pacientovi) výrazné subjektívne ťažkosti, ktoré zhoršujú kvalitu jej (jeho) života. Odstránenie nezhubného nádoru prsníka je možné i na výslovnú žiadosť pacienta, ktorá plynie z obavy pred vývojom onkologickej choroby.

Spôsob operácie:

Odstránenie ohraničeného nezhubného nádoru s následnou rekonštrukciou prsníka so snahou o zachovanie optimálneho tvaru prsníka. Z tohto dôvodu je niekedy potrebné použitie tzv. onkoplastických technik operovania, ktoré znižujú riziko pooperačnej deformity prsníka po odstránení nádoru.

Možné riziká a komplikácie výkonu:

Chirurgické komplikácie počas operácie :

- Riziko poranenia hrudnej steny pri odstraňovaní rozsiahleho nádoru s možným rizikom preniknutia vzduchu do hrudnej dutiny (pneumothorax) a veľkej cievy (vzduchová embólia),
- termické poškodenia kože pri zastavovaní krvácania počas operácie pri práci s elektrokoagulačnou jednotkou, ktorá slúži na zastavovanie krvácania,
- riziko útlaku nervov a mäkkých častí na hornej končatine spôsobené polohou na operačnom stole s rizikom dočasnej straty jej hybnosti alebo citlivosti.

Včasné pooperačné komplikácie:

- Krvácanie do operačnej rany s vytvorením krvnej zrazeniny alebo priestor s obsahom čerstvej krvi, čo väčšinou vyžaduje reoperáciu s cieľom zastaviť krvácanie,
- nahromadenie tkanivového moku v mieste pod jazvou po odstránení prsníka (tzv.seróm),
- opuch v okolo rany a opuch hornej končatiny,
- infekcia operačnej rany,
- zmena citlivosti v oblasti podpazušnej jamky,
- dočasná porucha hybnosti a citlivosti hornej končatiny ako následok polohy na operačnom stole počas chirurgického zákroku,
- pooperačné komplikácie súvisiace s prítomnými pridruženými ochoreniami pacienta v čase operácie (kardiovaskulárne, tromboembolické komplikácie, dýchacie, tráviace ťažkosti, problémy s močením, komplikácie v súvislosti s diabetom a pod.).

Neskoré pooperačné komplikácie:

- Deformita prsníka ako následok odstránenia väčšieho objemu tkaniva prsníka alebo komplikovaného hojenia operačnej rany,
- strata citlivosti v oblasti operačnej jazvy na hrudníku, prípadne v oblasti podpazušnej jamky, vnútornej plochy ramena a predlaktia,
- nevzhľadná jazva po odstránení nádoru prsníka,
- bolesti v jazve po odstránení nádoru prsníka.

Riziká z pohľadu onkologickej choroby:

Napriek komplexnej predoperačnej diagnostike, ktorá zistila nezhubný nádor, nie je možné jednoznačne vylúčiť, že pooperačné histopatologické vyšetrenie celého odstráneného nádoru zistí prítomnosť zhubnej, rakovinovej choroby v prsníku. Takéto zistenie môže mať za následok potrebu ďalšieho chirurgického zákroku a následnej liečby.